

PROTEXIN AQUA-BOOST dla gołębi

Cena :
38,00 zł
38,00 zł

Producent : **Columbovet**
Dostępność : **Dostępny**
Stan magazynowy : **bardzo wysoki**
Średnia ocena : **brak recenzji**

Rozpuszczalny w wodzie preparat wieloelektrolitowo-witaminowy zawierający składniki naturalnej flory jelitowej: zasiedla przewód pokarmowy naturalną florą bakteryjną, zapobiega kolonizacji przewodu pokarmowego przez enteropatogeny (*Salmonella* spp., *E. coli*), stymuluje układ odpornościowy, zmniejsza liczbę problemów zdrowotnych w hodowli, poprawia kondycję ptaków.

WSKAZANIA: Okres lotów gołębi pocztowych, w czasie przygotowania do wystaw i pokazów, w stanach wyczerpania, odwodnienie po biegunkach, regulacja zaburzeń w składzie flory bakteryjnej przewodu pokarmowego, zmniejszony apetyt, upośledzone wchłanianie witamin, rekonwalescencja po przebytych chorobach.

SKŁAD: Natrium chloratum - 73,08 g/kg, Kalium chloratum - 53,85 g/kg, Natrium citricum dichydratum - 84,62 g/kg, Jednowodzian glukozy - 769,23 g/kg, Magnesium sulfuricum - 1,31 g/kg, Vitaminum A - 769230 i.u./kg, Vitaminum D3 - 76923 i.u./kg, Vitaminum E - 153846 i.u./kg, Vitaminum K - 7,69 mg/kg, Vitaminum C - 7692,30 mg/kg, Biotinum - 1,54 mg/kg, Acidum folicum - 3,08 mg/kg, Thiaminum - 61,54 mg/kg, Riboflavinum - 15,38 mg/kg, Piridoxinum - 3,08 mg/kg, *Lactobacillus plantarum* - 1,26 x 10⁷, *Lactobacillus delbrueckii* subsp. *Bulgaricus* - 2,06 x 10⁷, *Lactobacillus acidophilus* - 2,06 x 10⁷, *Lactobacillus rhamnosus* - 2,06 x 10⁷, *Bifidobacterium bifidum* - 2,00 x 10⁷, *Streptococci salivarius* subsp. *Thermophilus* - 4,10 x 10⁷, *Enterococcus faecium* - 5,90 x 10⁷, *Aspergillus oryzae* - 5,32 x 10⁶, *Candida pintolepsii* - 5,32 x 10⁶, gwarantowana zawartość żywych mikroorganizmów - 2,0 x 10⁸ jik/g.

DAWKOWANIE: Preparat stosuje się w dawce 3 g preparatu na 1 litr wody dziennie w okresie lotów, pierzenia i okresie lęgowym. Roztwór preparatu po rozpuszczeniu w wodzie pitnej powinien być zużyty w ciągu 12 godzin. Poidel z roztworem preparatu nie należy ustawiać w miejscu nasłonecznionym. Woda użyta do rozcieńczenia preparatu nie powinna zawierać innych preparatów. Jednoczesne podanie chemioterapeutyków może obniżyć efekty podawania preparatu.

TRWAŁOŚĆ: 18 miesięcy od daty produkcji.

UWAGI: Należy unikać kontaktu preparatu ze skórą i błonami śluzowymi.

ZEZWOLENIE: GIW farm 4610/op07d/00.

PRODUCENT: Probiotics International (Wielka Brytania).